

LA RICERCA DOCUMENTA GRAVISSIMI RISCHI DELLA
VACCINAZIONE m-RNA ANTI-COVID 19 PER GLI ADOLESCENTI
12-17 ANNI



Introduzione

La ricerca [“COVID-19 Vaccine Safety in Adolescents Aged 12-17 Years — United States, December 14, 2020–July 16, 2021”](#) uscito il 6 Agosto, stronca definitivamente la campagna mediatica per la vaccinazione di bambini e gli adolescenti del presidente del Consiglio Superiore della Sanità e del CTS Franco Locatelli , del ministro della Sanità Roberto Speranza, del presidente della Società Italiana di pediatria e, di virologi mediatici nostrani , di qualche docente universitario di pediatria folk, edell’associazione dei Presidi italiani e di qualche Presidente di Regione, aprendo le porte a un intervento diretto della magistratura e della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici per ridurre al silenzio gli analfabeti , le povertà morali e le violazioni deontologiche difendendo bambini, giovani e adolescenti da un delirio vaccinale che non li riguarda. I soggetti citati infatti “ex-catedra” servendosi dei mezzi di comunicazione di massa cercano e hanno cercato in continuazione

LA RICERCA DOCUMENTA GRAVISSIMI RISCHI DELLA
VACCINAZIONE m-RNA ANTI-COVID 19 PER GLI ADOLESCENTI
12-17 ANNI

di rassicurare i genitori di adolescenti e bambini sul fatto che la vaccinazione mRNA anti SARS-COV 2 è esente da effetti avversi ma che la ricerca (6 Agosto) citata confuta clamorosamente.

Come già i dati epidemiologici avevano indicato, [il rapporto casi/fatalità nelle persone con età inferiore o uguale a 29 anni è vicina allo zero o quasi](#), inoltre chi conosce un briciolo di immunologia e ha letto la prima parte del mio trattato sul SARS-COV 2: “ The virus entry”, sa che questo è dovuto al fatto che i giovani, gli adolescenti e i bambini sono protetti dal contagio e se raramente contagiati- probabilmente indice di alterazioni lipidiche della membrana cellulare, come nei soggetti a rischio- sono asintomatici o quasi e la loro immunità innata in pochi giorni elimina il virus rendendoli molto meno pericolosi di un soggetto vaccinato contro la prima edizione del SARS-COV 2 nel trasferire un virus mutato. [Lo studio pubblicato su Lancet di Erika Molteni, Carole H Sudre, Liane S, Canas et al.](#) , su una popolazione di 258 790 soggetti di età compresa tra 5-17 anni conferma la povertà sintomatica (stanchezza-cefalea) con una durata media da 6 a 7 giorni dei 1734 positivi inclusi nel tempo dello studio. Solo 77 avevano una durata sintomatologica superiore e di questi uno solo ha dovuto ricorrere a cure ospedaliere. Dei 258.760 bambini e ragazzi non è stato riportato alcun decesso. (per approfondire consultare il testo) Questo dimostra la potenza dell’immunità innata umorale dei bambini e dei ragazzi.

2. La ricerca USA

I dati della citata ricerca USA si basano su un sistema di rilevazione su segnalazioni spontanee da operatori sanitari o di chiunque (sistema VAERS) mentre una rilevazione diretta dagli adolescenti o da prossimi è stata fatta con il sistema V-safe dando agli ado una applicazione di rilevazione dei sintomi.

2.1 Rilevazione V-safe

LA RICERCA DOCUMENTA GRAVISSIMI RISCHI DELLA
VACCINAZIONE m-RNA ANTI-COVID 19 PER GLI ADOLESCENTI
12-17 ANNI

In questa rilevazione che durava 7 gg dopo la vaccinazione sono stati arruolati dal 14 Dicembre 2020 al 16 Luglio 2021 66.350 adolescenti di età 16-17 e 62709 di età 12-15. Sottoposti a una e due dosi di Pfizer-BioNTech. Durante la settimana nella fascia d'età 12-15 il 63,9% dopo la prima dose riportava effetti avversi locali e il 43,9 sistemici. Reazioni avverse sistemiche erano più frequenti dopo la seconda dose (63,4 locali - 48,9 sistemiche). Nella fascia 16-17 reazioni avverse sistemiche alla prima dose furono riportate dal 55,3 % dei ragazzi e dopo la seconda dal 69,9 %. Le reazioni erano più frequenti il giorno successivo alla vaccinazione. La reazione sistemica più frequente dopo la seconda dose è stata la febbre (1/3 degli ado dopo la seconda dose) . I/4 degli adolescenti hanno dichiarato di non essere stati in grado di svolgere le normali attività il giorno dopo la seconda dose. 1 adolescente su 100 secondo i ricercatori hanno avuto bisogno di cure mediche (ma cumulativamente 4 su 100) e ca 1,1 su 1000 sono stati ospedalizzati estrapolando i dati. Gli autori, sbagliando, hanno preso solo la percentuale degli adolescenti 12-15 anni dopo la seconda dose. (ca 56). In questa rilevazione, ovviamente non è stato possibile la rilevazione del numero dei morti. Per quanto riguarda la segnalazione di decessi di bambini attribuiti in Italia al Covid, le vere cause andrebbero ricercate con accuratezza scientifica e non con approssimazione ad usum ideologico.

In Inghilterra la vaccinazione sotto i 18 anni ufficialmente non è raccomandata dalla Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), governativa ritenendo che la mortalità da COVID per bambini e adolescenti è di ca 1 su 1.000.000 (molto inferiore a molte altre cause)

2.2. Sinopsi degli effetti avversi riportati dal sistema VAERS

Mortalità: 14 ragazzi su 9246 segnalazioni di cui effetti avversi gravi (n=868-includendo i decessi)

Gli effetti avversi non gravi sono stati 8363 .C'è da far rilevare che nello studio la sincope e

LA RICERCA DOCUMENTA GRAVISSIMI RISCHI DELLA
VACCINAZIONE m-RNA ANTI-COVID 19 PER GLI ADOLESCENTI
12-17 ANNI

la perdita di coscienza che incidono per 21,9 % sono stati categorizzati in effetti avversi non gravi.

Le miocarditi, (40,3%) grave effetto avverso, già segnalato in altri paesi è oggetto di una ulteriore rilevazione specifica). Dall'Aprile al Giugno al VAERS sono arrivate più di 1000 segnalazioni. Il fatto è molto preoccupante. Negli adulti incidono per 1 su 100.000 e le pericarditi 1,8 su 100.000 effetti avversi da cumularsi con altri .

Su 1537 atleti USA la prevalenza clinica e sub-clinica riscontrata invece è stata dello 2,3 su 100.

In Israele le stime per gli adolescenti sono state da un caso su 3000 a un caso su 6000.
(Science 1 Giugno 2021)

Questi dati smentiscono la WHO, e le prime rilevazioni in materia.

Effetti avversi gravi (Serious adverse effects) N=863 (includendo 14 ragazzi/e morti)

Chest pain	56.4
Increased troponin (segno di danno miocardico)	41.7
Myocarditis	40.3
Increased c-reactive protein	30.6
Negative SARS-CoV-2 test result	29.4

LA RICERCA DOCUMENTA GRAVISSIMI RISCHI DELLA
VACCINAZIONE m-RNA ANTI-COVID 19 PER GLI ADOLESCENTI
12-17 ANNI

Fever	28.3
Normal echocardiogram	26.9
Abnormal electrocardiogram	25.6
Headache	22.2
Difficulty breathing	21.4
Elevated electrocardiogram ST segment	20.5
Normal chest radiograph	19.7
Intensive care	18.1
Vomiting	17.0
Nausea	16,6

Effetti avversi "non severi" =8363

Dizziness (vertigini)	21.2
Syncope	14.4
Nausea	10.4
Headache	10.0

LA RICERCA DOCUMENTA GRAVISSIMI RISCHI DELLA
VACCINAZIONE m-RNA ANTI-COVID 19 PER GLI ADOLESCENTI
12-17 ANNI

Fever	8.3
Loss of consciousness	7.5
Excessive sweating	7.4
Fatigue	7.2
Pallor	7.1
Product administered to patient outside of indicated age range	
7.0	
Product storage error	6.4
Vomiting	6.4
Difficulty breathing	5.3
Chest pain	4.9
Pain	4.6

Siamo poi ancora all'oscuro sugli effetti avversi a lunga distanza (malattie auto-immuni e probabilmente tumori come prevedibile da evidenze scientifiche.

Ora tenendo presente che gli adolescenti sono a rischio zero o quasi per la mortalità da COVID-19, come appare, dai dati epidemiologici e dallo studio di Molteni e altri è chiaro

LA RICERCA DOCUMENTA GRAVISSIMI RISCHI DELLA
VACCINAZIONE m-RNA ANTI-COVID 19 PER GLI ADOLESCENTI
12-17 ANNI

che da un punto di vista morale non sembra “un atto d’amore” e moralmente e deontologicamente lecito indurre la vaccinazione o vaccinare bambini e adolescenti questi perché potrebbero “contagiare”. Ma la forte reazione immunitaria innata dei ragazzi, che solo in una minima percentuale sono asintomatici e positivi e (stanchezza-cefalea), oltre a modificare il virus con la difesa immunitaria e attenuarne la pericolosità, lo eliminano rapidamente.

La strategia giusta a livello mondiale per affrontare il COVID-19 e le sue prevedibili e pericolosi varianti, già in selezione, come ogni altra malattia infettiva e il cancro è “l’immuno-stimolazione preventiva e l’induzione dell’allostasi anti-virale, facilmente realizzabile.

3. Diffida pubblica

Il [Comitato Sanitario Nazionale](#), la [Scuola medica di Milano](#), la [Società Italiana di Adolescentologia e di medicina dell’adolescenza](#) diffidano pubblicamente chicchessia dal proporre, indurre ed effettuare vaccinazioni a bambini e adolescenti anche con modi subdoli e servendosi dei media riservandosi ogni azione legale .

A partire da oggi ogni induttore di vaccinazione degli adolescenti o medico o altri che vaccinino bambini o adolescenti saranno oggetto di denuncia penale.

4. Jorge Maria Bergoglio (“Papa Francesco”)

Ci riferiamo anche all’ultima uscita di Jorge Maria Bergoglio “Papa Francesco”, “opinion leader” mondiale che, probabilmente consigliato male, esorta alla vaccinazione come “atto d’amore”, confermando i suoi difficili rapporti con l’idea dell’esistenza di un’idea della verità oggettiva emersa nell’enciclica “ Evangelii Gaudium” (“La realtà è, l’idea si elabora”)

LA RICERCA DOCUMENTA GRAVISSIMI RISCHI DELLA
VACCINAZIONE m-RNA ANTI-COVID 19 PER GLI ADOLESCENTI
12-17 ANNI

Jorge Maria Bergoglio vada a chiedere se i genitori che hanno autorizzato la vaccinazione dei figli minori, a rischio zero per il COVID-19, poi deceduti dopo il vaccino, se pensano di aver fatto un "atto d'amore".

Amore e verità sono inseparabili in chi segue Gesù Cristo.

Da dove nascono questi omicidi se non dalla mancanza di rispetto della verità che i bambini e i ragazzi non sono a rischio di COVID-19 e delle sue conseguenze, se non prevenute e curate bene, e che nessuno, nemmeno un "Papa" può indurre un rischio la loro salute e la loro vita.

di Giuseppe R.Brera

(nel ruolo di)

President of the World Health Committee- WCHMPC

· Presidente del Comitato Sanitario nazionale , Direttore Scuola Medica di
Milano, Presidente della Società Italiana di Adolescentologia e Medicina
dell'adolescenza

References

1. Brera G.R. SARS-COV-2 ALLOSTASIS AND THE PEOPLE AND PERSON CENTERED PREVENTION A NEW PREVENTION STRATEGY BASED ON A PEOPLE'S METABOLIC AND IMMUNE SHIELD FOR THE PANDEMIC SHUTDOWN - 1065 references. 632 p. - 1065 references.

LA RICERCA DOCUMENTA GRAVISSIMI RISCHI DELLA
VACCINAZIONE m-RNA ANTI-COVID 19 PER GLI ADOLESCENTI
12-17 ANNI

2. [Part 1: "THE SARS-COV 2 ENTRY RELATIVITY AND COVID 19 138 pp. euro 30 e-book and printed Milan, Università Ambrosiana ed. 2021 ISBN: 9798530093906](#)
3. Part 2 - THE SARS-COV 2- INDUCED IMMUNOSUPPRESSION AND COVID-19 ANERGY
4. Part 3 THE ANTI-VIRAL PREVENTIVE IMMUNOSTIMULATION AND METABOLIC ALLOSTASIS

337 pages- 600 references -ISBN 9798547583520 (IN PRESS)

5. [Brera G.R : Person-Centered Medicine and Person-Centered Clinical Method-Clinical results of the Medicine unitary paradigm teaching and the SARS-COV 2 entry relativity inducing COVID-19 person-centered prevention.- 131 p. -132 references euro 25 - e-book and print ISBN: 9798726465432"](#)
6. Keehner J, Horton LE, Pfeffer MA, et al. SARS-CoV-2 Infection after Vaccination in Health Care Workers in California. *N Engl J Med.* 2021;384(18):1774-1775. doi:10.1056/NEJMc210192
7. [2] Bannister S, Messina NL, Novakovic B, Curtis N. The emerging role of epigenetics in the immune response to vaccination and infection: a systematic review. *Epigenetics.* 2020;15(6-7):555-593. doi:10.1080/15592294.2020.1712814
8. [3]Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality Committee to Review Adverse Effects of Vaccines; Institute of Medicine; Stratton K, Ford A, Rusch E, et al., editors.Washington (DC): National Academies Press (US); 2011 Aug 25
9. CDC COVID-19 Response Team; Food and Drug Administration. Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine - United States, December 14-23, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 2021;70(2):46-51. Published 2021 Jan 15. doi:10.15585/mmwr.mm7002e1

[5]Ibidem 2

[6] Ibidem 2

LA RICERCA DOCUMENTA GRAVISSIMI RISCHI DELLA
VACCINAZIONE m-RNA ANTI-COVID 19 PER GLI ADOLESCENTI
12-17 ANNI

Gli atti del Congresso (in italiano e Inglese) :

“Il cambiamento di paradigma centrato sulla persona ,del concetto di salute , della Medicina e il COVID-19

The person-centered paradigm change of health and Medicine paradigms and COVID-19

Sono scaricabili gratuitamente dal sito dell'Università Ambrosiana

www.unambro.it

o dal sito dello “ [World Committee for Health and Medicine Paradigm Change](#)”

By communication@scuolamedicamilano.it

Distributed worldwide by Amazon and the editorial staff of the Ambrosiana University
editorialdepartment@unambro.i

© Copyright Comitato Sanitario Nazionale 2021

[Supporta il Comitato Sanitario Nazionale Italiano e lo World Health Committee con una donazione](#)

[Donate to the Italian National Health Committee and World Health Committee](#)

LA RICERCA DOCUMENTA GRAVISSIMI RISCHI DELLA
VACCINAZIONE m-RNA ANTI-COVID 19 PER GLI ADOLESCENTI
12-17 ANNI

Revisionato da Johannes Mazetés CSN and WHC editorial Director

©Copyright Comitato Sanitario Nazionale 2021

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Submit Rating

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!